



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ 
OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DES INVERTÉBRÉS

PHOTO-GUIDE DE RECONNAISSANCE DES MARGUERITES

Bassin Rhône-Saône-Jura



VÉGÉTAL
local



INDEX

Marguerite brûlée - <i>Leucanthemum adustum</i>	5
Marguerite variable - <i>Leucanthemum ircutianum</i>	6
Marguerite commune - <i>Leucanthemum vulgare</i>	7

Illustrations et photographies :

Christophe HENNEQUIN (tous droits réservés)


Référence bibliographique :

Hennequin C., 2026. *Photo-guide de reconnaissance des marguerites*. Bassin Rhône-Saône-Jura. Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté Observatoire régional des Invertébrés. 9 p.

LES MARGUERITES

Les marguerites sont des astéracées (ou composées) assez fréquentes dans les prairies et les pelouses. Cependant, ce que l'on nommait il y a encore quelques années « *Leucanthemum vulgare* Lam. s.l. » a été décliné en plusieurs taxons aujourd'hui. On observe en Franche-Comté trois taxons, dont l'un est désigné par *Leucanthemum vulgare* (Vaill.) Lam., ce qui ne simplifie pas la problématique de dénommer les marguerites et peut engendrer des confusions ou des erreurs de synonymie.

CLÉ D'IDENTIFICATION DES MARGUERITES





1. Feuilles caulinaires elliptiques à lancéolées, insensiblement atténues, de la largeur de la tige à leur base, parfois arrondies, mais sans oreillettes pennatipartites. Tige généralement non ramifiée, à un seul capitule

..... ***Leucanthemum adustum* (W.D.J. Koch) Greml.**

1'. Feuilles caulinaires lyrées, pourvues d'oreillettes découpées (pennatipartites, lyrées) embrassantes. Tige généralement simple ou plus ou moins ramifiée, polycephale

2. Feuilles caulinaires médianes à limbe étroit. Limbe munie d'1 à 4 paires de dents. Oreillettes ayant des découpes généralement égales ou plus longues que la largeur du limbe, entre 3 et 8 mm de long. Tige simple ou à 1 ou 2 rameaux.


..... ***Leucanthemum vulgare* (Vaill.) Lam.**



2'. Feuilles caulinaires médianes à limbe plus large, ovales-lancéolées à spatulées, à nombreuses dents (plus de 6 paires en général). Oreillettes à découpes moins longues que la largeur du limbe. Tige simple ou plus ou moins ramifiées

..... ***Leucanthemum ircutianum* DC**



MARGUERITE VARIABLE



Leucanthemum adustum

Marguerite brûlée



Habitats : Ourlets forestiers, éboulis et pelouses montagnardes.
Dates de floraison : mai-septembre



Leucanthemum ircutianum

Marguerite variable

Habitats : Pelouses et prairies maigres à mésophiles.
Dates de floraison : juillet-novembre






Leucanthemum vulgare

Marguerite commune

Habitats : Pelouses sèches et prairies maigres.

Dates de floraison : juillet-octobre

à rechercher



LEXIQUE

Appliqué : se dit d'un organe, un poil qui forme un angle très aigu ou sont parallèles à la surface qui les porte (ant. : étalé).

Bractée : petite feuille ou écaille située à la base d'une inflorescence, d'un groupe de fleurs ou d'un pédoncule.

Capitule : inflorescence typique chez les astéracées et les dipsacacées formée par des fleurs sessiles ou sub-sessiles, rassemblées sur un réceptacle commun.

Caulinaire : qui a rapport à la tige, qui s'insère sur la tige.

Cypsèle : fruit sec indéhiscent à graine unique, équivalent de l'akène, mais issu d'un ovaire infère, chez les Astéracées et les Caprifoliacées.

Involute : ensemble des bractées souvent en verticille à la base d'une inflorescence.

Lancéolé : en forme de fer de lance, rétréci progressivement aux deux extrémités.

Ligulé : corolle des fleurs non en tube des astéracées (composées), par exemple les fleurs blanches des marguerites sont des fleurs « ligulées »

Lyré : organe terminé par un segment médian beaucoup plus grand que les latéraux.

Monocéphale : à une seule tête ou inflorescence (capitule).

Oreillettes : expansions foliacées à la base d'un limbe foliaire, d'une bractée embrassante ou d'un pétiole.

Pédoncule : axe qui supporte une fleur ou un ensemble de fleurs et qui est rattaché à la tige.

Pennatipartite : feuille dont le limbe est penné et découpé entre le milieu de chaque moitié de limbe et la nervure principale .

Pétiole : axe de la feuille reliant le limbe à la tige.

Polycéphale : à plusieurs têtes ou inflorescences (capitules).

Rayonnant : disposé comme des rayons, souvent utilisé pour indiquer des fleurs plus grandes ou zygomorphes à la périphérie de l'inflorescences, celles du centre étant plus petites et actinomorphes.

Ramifié : se dit d'une tige développant des rameaux secondaires issus de bourgeons axillaires.

Tubulé, tubuleux : en forme de tube.



SIÈGE ET ANTENNE FRANCHE-COMTÉ

9 rue Jacquard
BP 61738
25043 Besançon Cedex
03.81.83.03.58

ANTENNE BOURGOGNE

Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

SUIVEZ-NOUS



www.cbnbfc-ori.fr

AVEC LE
SOUTIEN DE

