



CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ 
OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DES INVERTÉBRÉS

PHOTO-GUIDE DE RECONNAISSANCE DES VESCES

Bassin Rhône-Saône-Jura



VÉGÉTAL
local



INDEX

Vesce hérissée, vesce hirsute - <i>Ervilia hirsuta</i>	1
Vesce à quatre graines - <i>Ervum tetraspermum</i>	2
Vesce à folioles étroites, vesce noire - <i>Vicia angustifolia</i>	3
Grande jarosse, vesce de Cracovie - <i>Vicia cracca</i>	4
Vesce variée - <i>Vicia dasycarpa</i>	5
Vesce des buissons - <i>Vicia dumetorum</i>	6
Vesce à grandes fleurs - <i>Vicia grandiflora</i>	7
Vesce printanière - <i>Vicia lathyroides</i>	8
Vesce jaune - <i>Vicia lutea</i>	9
Vesce de Hongrie - <i>Vicia pannonica</i>	10
Vesce des moissons - <i>Vicia segetalis</i>	11
Vesce des haies - <i>Vicia sepium</i>	12
Vesce à feuilles ténues - <i>Vicia tenuifolia</i>	13
Vesce velue, vesce de Cerdagne - <i>Vicia villosa</i>	14

Illustrations et photographies :

Christophe HENNEQUIN (tous droits réservés)


Référence bibliographique :

Hennequin C., 2026. *Photo-guide de reconnaissance des vesces*. Bassin Rhône-Saône-Jura. Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franche-Comté Observatoire régional des Invertébrés. 17 p.

CLÉ DE DÉTERMINATION DES VESCES

- 1. Corolle inférieure à 6 mm de long** 2
 - 2.** Inflorescences 2-8 fleurs ; corolle blanche *Ervilia hirsuta*
 - 2'.** Inflorescences 1-3 fleurs ; corolle rosée *Ervum tetraspermum*
- 1'. Corolle supérieure à 6 mm de long** 3
 - 3.** Pédoncules d'inflorescences < 20 % de la feuille adjacente 4
 - 4.** Inflorescences souvent à plus de 4 fleurs *Vicia sepium*
 - 4'.** Inflorescences 2-4 fleurs *Vicia pannonica*
 - 4''.** Inflorescences 1-2 fleurs 5
 - 5.** Fleurs jaunes ou jaunâtres 6
 - 6.** Calice à dent inférieure plus longue que les autres *Vicia lutea*
 - 6'.** Calice à dents égales *Vicia grandiflora*
 - 5'.** Fleurs roses, rouges ou violacées 7
 - 7.** Corolle < 9 mm de long ; feuilles supérieures à 2-3 paires de folioles *Vicia lathyroides*
 - 7'.** Corolle > 10 mm de long ; feuilles supérieures à plus de 3 paires de folioles .. 8
 - 8.** Folioles des feuilles supérieures à L/l > 10 *Vicia angustifolia*
 - 8'.** Folioles des feuilles supérieures à L/l < 10 *Vicia segetalis*
 - 3'.** Pédoncules d'inflorescences > 20 % de la feuille adjacente
 - 9.** Feuilles à folioles > 10 mm de large *Vicia dumetorum*
 - 9'.** Feuilles à folioles < 10 mm de large 10
 - 10.** Limbe de l'étendard inférieur à l'onglet 11
 - 11.** Tige à poils étalés, denses, d'aspect laineux *Vicia villosa*
 - 11'.** Tige glabre ou à poils épars, généralement appliqués *Vicia dasycarpa*
 - 10'.** Limbe de l'étendard supérieur à l'onglet 12
 - 12.** Folioles glabres à la face supérieure. Longueur des fleurs majoritairement supérieure à 12 mm. Généralement, pédoncules égalant environ la longueur de la feuille sous-tendant l'inflorescence. Stipules des feuilles supérieures entières, linéaires *Vicia tenuifolia*
 - 12'.** Folioles poilues à la face supérieure. Longueur des fleurs majoritairement inférieure à 12 mm. Généralement, pédoncules plus courts que la longueur de la feuille sous-tendant l'inflorescence. Stipules des feuilles supérieures à deux pointes divergentes *Vicia cracca*

VESCE DE CRACOVIE



Ervilia hirsuta

Vesce hérissée, vesce hirsute

Habitats : Prairies, champs et friches

Dates de floraison : mai-juillet



Port général de la plante



Inflorescence en grappe à 3/6 fleurs blanches, longuement pédonculée



Stipules



Gousses mûres, velues



Feuille à 6/10 paires de folioles, terminée par une vrille

Ervum tetraspermum

Vesce à quatre graines

Habitats : Prairies, champs et friches


Dates de floraison : mai-juillet



Port général de la plante



*Inflorescence en grappe à 1/2
fleurs lilas, longuement pédonculée*



Gousses glabres, à 4 graines



Feuille à 3/7 paires de folioles, terminée par une vrille. Stipules

Vicia angustifolia

Vesce à folioles étroites, vesce noire

Habitats : Prairies et pelouses acidiphiles

Dates de floraison : mai-novembre



Port général de la plante



Fleurs rose pourpre solitaires (ou par deux) courtement pédonculées



Feuille à 4/7 paires de folioles étroites, terminée par une vrille



Gousse glabre



Stipules

Vicia cracca

Grande jarosse, vesce de Cracovie

Habitats : Pelouses sèches, prairies, sentiers, lisières
Dates de floraison : juin-août



Port général de la plante



Inflorescence en grappe multiflore
(10 à 40), longuement pédonculée



Stipules



Infrutescence de gousses



Feuille à folioles poilues supérieurement

Vicia dasycarpa

Vesce variée

Habitats : Lisières, bosquets, sentiers, champs
Dates de floraison : juin-août




Port général de la plante



Fleurs pourpre violacé, à tube plus long que le limbe de l'étendard



Infrutescences



Gousses mûres



Inflorescence en grappe multiflore, longuement pédonculée

Vicia dumetorum

Vesce des buissons

Habitats : Lisières, bosquets, sentiers, bois clairs
Dates de floraison : juin-août



Port général de la plante



Inflorescence en grappe à 5/12 fleurs pourpres puis jaunâtres, longuement pédonculée



Stipules



Détail des folioles ovales, mucronées

Vicia grandiflora

Vesce à grandes fleurs

Habitats : Chemins, friches

Dates de floraison : mai-juin

Très rare, adventice, uniquement connue à Delle (90)



Port général de la plante



Fleurs solitaires (ou par deux) courtement pédonculées. Calice à dents égales



Gousse



Feuilles, fleurs et jeune gousse

Vicia lathyroides

Vesce printanière

Habitats : Prairies maigres, sols sablonneux

Dates de floraison : avril-mai

Très rare en Franche-Comté



Port général de la plante



Fleur violette solitaire à l'aisselle d'une
feuille bractéale (à 2 à 3 paires de folioles)



Tige, feuilles et stipules velus

Vicia lutea

Vesce jaune

Habitats : Pelouses sèches, sentiers, champs

Dates de floraison : mai-juillet

Très rare en Franche-Comté



Port général de la plante



Calice à dents inégales. Feuille à 4/9 paires de folioles et vrille



Fleur jaune pâle, glabre

Vicia pannonica

Vesce de Hongrie

Habitats : Champs, sentiers, friches

Dates de floraison : mai-juillet



Port général de la sous-espèce striata



Fleurs à étendard velu sur le dessus



Port général de la sous-espèce pannonica



Inflorescence en grappe de 2/4 fleurs, courtement pédonculée

Vicia segetalis

Vesce des moissons

Habitats : Pelouses sèches, prairies, cultures, friches
Dates de floraison : mai-juillet



Port général de la plante



Fleur solitaire ou géminée, rose pourpre



Gousses dressées, glabres



Stipule et folioles obovales

Vicia sepium

Vesce des haies

Habitats : Prairies, lisières forestières

Dates de floraison : avril-juillet



Port général de la plante



Fleurs pourpre violacé clair, en grappe subsessile de 3/6 fleurs



Stipules



Gousses glabres



Feuilles à 4/7 paires de folioles ovales mucronées

Vicia tenuifolia

Vesce à feuilles ténues

Habitats : Bosquets, lisières thermophiles

Dates de floraison : juin-août



Port général de la plante



Inflorescence en grappe multiflore (10 à 40), très longuement pédonculée



Gousses



Feuille à 9/14 paires de folioles étroites, terminée par une vrille. Stipules étroites

Vicia villosa

Vesce velue, vesce de Cerdagne

Habitats : Champs, sentiers, friches

Dates de floraison : juin-août



Port général de la plante



Inflorescence en grappe multiflore
(10 à 40), longuement pédonculée



Pilosité abondante des tiges et feuilles



Jeunes gousses

LEXIQUE

Acuminé : terminé par une pointe effilée.

Aile : pétales latéraux chez les fabacées (fabacées).

Bractée : petite feuille ou écaille située à la base d'une inflorescence, d'un groupe de fleurs ou d'un pédoncule.

Bractéole : petite bractée située à la base d'un pédicelle.

Carène : nom donné aux deux pétales inférieurs, soudés par une partie de leur limbe, des fleurs de fabacées (fabacées).

Elliptique : en forme d'ellipse.

Étalé : se dit d'un organe, d'un poil faisant un angle de 90° avec la surface qui le porte (ant. Appliqué, apprimé).

Étendard : pétale supérieur de la fleur des fabacées (fabacées), souvent redressé.

Foliole : partie du limbe chez une feuille composée.

Gousse : fruit sec, formé par un seul carpelle, généralement déhiscent, s'ouvrant par deux fentes (exception : gousses lomentacées, divisées en articles indéhiscentes, par exemple chez le sainfoin).

Inflorescence : ensemble des fleurs, des pédoncules et pédicelles, des bractées et bractéoles d'une plante.

Infrutescence : l'ensemble des fruits, des pédoncules et pédicelles, des bractées et bractéoles d'une plante.

Obcordé : en forme de cœur à l'envers.

Obovale : ovale, mais avec la plus grande largeur vers le sommet (comme un œuf à l'envers).

Ovoïde : qui se rapproche de la forme d'un œuf.

Pauciflore : pauvre en fleur, portant peu de fleurs.

Pédicelle : axe qui supporte une fleur et est rattaché à un pédoncule.

Pédoncule : axe qui supporte une fleur ou un ensemble de fleurs et qui est rattaché à la tige.

Pétiole : axe de la feuille reliant le limbe à la tige.

Pétiolule : en parlant d'une feuille composée, petit pétiole secondaire reliant le limbe des folioles au rachis (ou pétiole).

Réfléchi : recourbé vers le bas.

Sessile : organe dépourvu d'axe d'attache (pédoncule, pédicelle, pétiole, stipe...).

Stipule : appendices foliacés, membraneux ou épineux situés de part et d'autre de la base d'un pétiole.

Subopposé : presque opposé.

Subulé : se rétrécissant en une pointe très aigüe.



SIÈGE ET ANTENNE FRANCHE-COMTÉ

9 rue Jacquard
BP 61738
25043 Besançon Cedex
03.81.83.03.58

ANTENNE BOURGOGNE

Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

SUIVEZ-NOUS



www.cbnbfc-ori.fr

AVEC LE
SOUTIEN DE

